КЛІНІКО-ПАРАКЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГРИПОПОДІБНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ

Автори: Воротняк Ірина Олександрівна, Іванова Лорина Алімівна

Буковинський державний медичний університет, Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб

АКТУАЛЬНІСТЬ ТА СТАТИСТИКА

Грип та ГПЗ — найпоширеніші інфекційні хвороби на земній кулі; етіотропна терапія існує лише для грипу.

Захворюваність в Україні в період грудень-квітень 2022/2023 рр.:

1 395 556	1 728	22 (2)
звернень дітей	дітей госпіталізовано	летальні випадки (діти)

Мета роботи: Дослідити клініко-параклінічні особливості перебігу грипу в порівнянні з іншими ГПЗ у дітей в епідемічному сезоні 2022-2023 років.

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ

Проаналізовано **146 історій хвороб** дітей, госпіталізованих в інфекційні відділення ОКНП «Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня» (грудень 2022 – квітень 2023 рр.).

Характеристика груп порівняння:

Показник	I група (Грип, n=61)	II група (ГПЗ, n=39)	p, pφ
Вік, роки	3,2 ± 0,3	2,4 ± 0,4	>0,05
Хлопчики, %	55,7%	56,4%	>0,05
Мешканці сіл, %	59,0%	65,9%	>0,05

(Групи порівнянні за основними ознаками, p>0,05).

ПОКАЗНИКИ ЗАГАЛЬНОГО АНАЛІЗУ КРОВІ

Показник	I група (Грип)	II група (ГПЗ)	p
Гемоглобін, г/л	141,8 ± 2,7	138,2 ± 3,5	>0,05
Еритроцити, Т/л	5,1 ± 0,12	5,0 ± 0,17	>0,05
Кольоровий показник	0,84 ± 0,01	0,83 ± 0,01	>0,05
Лейкоцити, Г/л	8,6 ± 0,56	10,7 ± 1,36	>0,05
ШОЕ, мм/год	10,9 ± 0,86	10,6 ± 1,14	>0,05
Еозинофіли, %	1,6 ± 0,55	1,3 ± 0,20	>0,05
Паличкоядерні, %	10,3 ± 1,46	10,4 ± 1,18	>0,05
Сегментоядерні, %	44,4 ± 2,45	46,0 ± 2,49	>0,05
Лімфоцити, %	36,7 ± 2,59	35,1 ± 2,88	>0,05
Моноцити, %	6,5 ± 0,54	6,8 ± 1,08	>0,05

ВІДМІННІ ОЗНАКИ ГРИПУ ТА ГПЗ (CDC / ВЛАСНІ ДАНІ)

Симптом	Грип (CDC / Власні дані)	ГПЗ (CDC / Власні дані)
Поява симптомів	Різка (+)	Поступова (+)
Лихоманка	Фебрильна, 3-4 дні (+)	Відсутня / субфебрильна (+)
Біль в м'язах	Виражений (+/-)	Незначний (-)
Кашель	Поширений / серйозний (+)	Легкий / помірний (+)
Нежить	Іноді (+)	Поширений (+)
Блювання / Діарея	Іноді (+) / (+/-)	Рідкісний (+/-) / (+/-)

ВИСНОВКИ

1. Епідеміологічною особливістю грипу є наявність відомого внутрішньосімейного джерела інфікування.
2. У більшості дітей найчастішими скаргами були лихоманка, кашель, нежить, загальна слабкість; у дошкільнят хворих на грип кашель спостерігався вірогідно частіше.
3. У пацієнтів з грипом вірогідно частіше спостерігалось блювання та персистував середньотяжкий ексикоз.
4. У дітей з ГПЗ частіше реєстрували ознаки риніту, що у немовлят значно утруднювало грудне вигодовування.
5. Лейкопенія при грипі виявилась низькоспецифічним та низькочутливим лабораторним маркером; клінічні особливості дозволяють раніше призначати етіотропну терапію.