

ПОШИРЕНІСТЬ РЕТЕНЦІЇ ПОСТІЙНИХ ЗУБІВ У ДІТЕЙ

Автори: Деркачук О.А., Котельбан А.В.

Мета дослідження. Визначити сучасний стан питання щодо поширеності ретенції зубів у дітей за даними наукової літератури останнього десятиліття.:

Матеріали і методи дослідження. Для реалізації поставленої мети було опрацьовано публікації з науково-метричних баз даних PubMed та Scopus за період 2015–2025 рр.

Результати. За даними Youn-Kyung Choi та співавт. (2025 р.) загальна поширеність ретенцій становить 24,5 %. Серед таких пацієнтів 68,2 % мають один непрорізаний зуб, 27,5 % — два, а 4,3 % — три або більше. Найчастіше ураженими виявилися верхні ікла (50,1 %), нижні другі моляри (11,7 %) та верхні другі премоляри (9,6 %). У дослідженні Yuseong Zhou та співавт. (2025 р.) частота ретенцій становила 7,26 %, серед яких переважали верхні ікла (39,51 %) та верхні різці (30,24 %). Chiewee Tan та співавт. (2018 р.) повідомили, що поширеність непрорізаних постійних різців серед дітей і підлітків становить 2,0 %, причому у 70,6 % випадків це були верхні центральні різці. Mai Lin Lövgren та співавт. (2019 р.) визначили, що частота ретенованих верхніх іклів у дітей і підлітків становить 1,1 %, при цьому 85 % із них мають піднебінне розташування.

