Козловська І.М., Петровка В.М.

ВІД РАНИ СТОПИ ДО БЛИСКАВИЧНОГО СЕПТИЧНОГО ШОКУ НА ТЛІ АНАЕРОБНОЇ ІНФЕКЦІЇ У ПАЦІЄНТКИ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАВЕТОМ

Актуальність



Інфекції стони у пацієнтів із ЦД можуть прогресувати від локального запалення до глибоких уражень, генералізації та сентичного шоку.
Умови для активації АІ: ішемія кінцівок, ЦД, зниження реактивності.

Мета роботи

Продемонструвати особлиос бакскканянві генеравізації Аі на таі ЦД, вио почаласа 2 раии стони і закерниласа летальним токсикп-бактеріальним юоком. Наголосити на важзявості ранньої діатностити АІ І комплексного лієування.

Матеріали та методи

Аналіз перебіту захворювання за медичною документацією, часу генералізації інфекції, розвитту критичного стану. Оцінка SOFA.

Опис клінічного випадку



Жіика 53 р. з ЦД 1 типу.

Первнинний осередок: колота рана стопи (польові роботи, 5 тижиів тому, хірургічна обробса). Поступила з ЦД, маститом.

Week 1 — Week 3 — Day 3 Hospitalization — 7 Hours Post-Op



На 3 добу: раптове погіршення. Набрак, почервоніння стоии, гомілки. Передедена у ВІТ.

Результати та Обговорення

Септичиий шок: АТ=70 мм.рт.ст. (на дофаміні).

Лабораториі: PaO2/FlO2=180, Тромбоцити=39 000/мл, Вілірубін=109 мкмоль/л, Креатииіп=310 мкмоль/л.

Шкала Глааго: 8 балів.

Індекс **SOFA = 18** балів.

Бактеріологічие досліджеиия: виявлено Clostridium perifingens.

Лікуваиия: 3 антибіотики, дезінтоксиканія, корекція ЦД, Термінові широкі поздожкиі розріли гомілки та стегна (гиійного ексудату не виявлено).

Діагностична тактика

Висока настороженість: інтенсивний біль, набрак, крепітація.

Ранні посівн крові та глибоких ткании.

Моніторинг SOFA, лактату, LRINEC.

Рентгенографія (вияалення газу), **КТ** (поширения). Не відкладати операцію!

Невідкладна хірургічна ревіаія та дебридмент некротизованих ткании.

Висновки

Тяжкість анаеробного сепсису та відсутність специфічних симптомів вимагають розробки схеми його скосчасної діагностики. У даному випадку діагноз астановлено на основі клінічних, бактеріологічних та лабораторних даних (шкала SOFA).

Ключові стова: анаеробна інфекція, ЦД, діабетична стопа, сепсис, септичний шок, токсико-бактеріальний шок.