Охоплення дівчат-підлітків вакциною проти ВПЛ та доступні джерела інформації

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

ВПЛ є головною етіологічною причиною раку шийки матки. Вакцинація найбільш дієва в підлітковому віці до початку статевого життя. З 1 січня 2026 р. в Україні діє оновлений Календар щеплень з обов'язковою імунізацією дівчат 12–13 років, що потребує подолання суспільних упереджень та підвищення інформованості.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

Комплексно дослідити рівень охоплення щепленням проти ВПЛ дівчат-підлітків у закладі середньої освіти, з'ясувати структуру доступних джерел медичної інформації, виявити базові перестороги та оцінити вплив бесіди з медпрацівником на рівень довіри до вакцинації.

20,0%
Охоплення вакцинацією
5 із 25 опитаних дівчат (ЦГЗ: 15–17%)

76,0%
Інформація від лікаря
19 респондентів; 100% серед щеплених

+28%
Зростання впевненості
З 60% до 88% після бесіди з медиком

24,0%
Інформаційний вакуум
6 дівчат не мали жодного джерела

Структура поінформованості та динаміка сприйняття



Матеріали та методи

Проведено поперечне анкетування 25 учениць-підлітків ЗЗСО за спеціальним опитувальником. Відповіді категоризовано за типом джерел: медичні заклади/лікар («лікар»), ресурси МОЗ та тематичні портали («сайти»), соціальні мережі («соцмережі»). Застосовано методи описової варіаційної статистики.

Канали комунікації

До бесіди 24% респондентів не мали інформації взагалі. Після проведеної роз'яснювальної бесіди з лікарем 28% (7 учениць) самостійно звернулися до перевірених джерел: 4 респонденти звернулися до офіційних сайтів системи охорони здоров'я (МОЗ, ЦГЗ), а 2 учениці шукали матеріали в соцмережах.

Висновки та перспективи

1. Рівень вакцинації серед опитаних (20%) відповідає показникам по всій країні (15–17%).
2. Лікар — це головне джерело інформації та ключова людина, яка мотивує робити щеплення.
3. Роз'яснювальні бесіди у школах розвіюють страхи й суттєво підвищують впевненість у безпечності вакцини — з 60% до 88%.